

MEDTECH DIAGNOSTIC



SCLEROPROT

Technology matured by



Développement d'un test biologique de dépistage prescrit par les médecins généralistes pour différencier un syndrome de Raynaud d'une sclérodémie systémique débutante, afin d'orienter rapidement les patients vers les centres experts.

#Sclérodémie Systémique

#Syndrome de Raynaud

#Diagnostic Médical

#Dépistage

- Le phénomène de Raynaud touche ~5% de la population générale et 6 % des femmes entre 25 et 40 ans.
- 80% des cas sont idiopathiques, les 20% restants sont secondaires à d'autres pathologies qu'il convient de diagnostiquer le plus rapidement, le plus facilement et au moindre coût possible ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui.
- Dans le cadre d'une première phase d'investissement nous avons mis en évidence plusieurs combinaisons de biomarqueurs protéiques permettant de discriminer le Syndrome de Raynaud de la sclérodémie systémique.
- Avant d'entamer une nouvelle phase d'investissement nous souhaiterions discuter avec un industriel du diagnostic pour codévelopper un tel test dont les volumes seraient potentiellement conséquents.



Partenariat : Licence d'exploitation ou Co Développement

PI : A ce stade: Données

TRL : 4